

Vacunas recomendadas en el 2023 para niños de

15 Meses

Escribe la fecha de vacunación en el cuadro junto a la vacuna una vez que tu hijo/a la haya recibido

Vacuna HepB	Hepatitis B (Esta dosis se puede administrar desde 1-2 meses)	(Dosis 3 de 3)	Fecha recibida
Vacuna DTaP	Difteria, tosferina y tétanos (Esta dosis se puede administrar desde 15-18 meses)	(Dosis 4 de 5)	Fecha recibida
Vacuna contra Hib*	Haemophilus influenzae tipo b (Esta dosis se puede administrar desde 12-15 meses)	(Dosis 4 de 4)	Fecha recibida
Vacuna PCV13, PCV15	Enfermedad neumocócica (Esta dosis se puede administrar desde 12-15 meses)	(Dosis 4 de 4)	Fecha recibida
Vacuna IPV	Poliomielitis (Esta dosis se puede administrar desde 16-18 meses)	(Dosis 3 de 4)	Fecha recibida
Vacuna contra el COVID-19**	del coronavirus 2019	(Dosis 1 de 1)	Fecha recibida
Vacuna contra la influenza†	Influenza (gripe)	(Dosis 1 de 1)	Fecha recibida
Vacuna MMR	Sarampión, paperas y rubéola (Esta dosis se puede administrar desde 16-18 meses)	(Dosis 1 de 2)	Fecha recibida
Vacuna contra la varicela	Varicela (Esta dosis se puede administrar desde 12-15 meses)	(Dosis 1 de 2)	Fecha recibida

NOTAS A PIE DE PÁGINA

COVID-19**

La cantidad de dosis recomendadas Influenza† HepA† depende de la edad de su hijo y el tipo de vacuna contra el COVID-19 usada.

Influenza†

Se recomiendan dos dosis con un intervalo de por lo menos 4 semanas para los niños de 6 meses a 8 años de edad que reciban por primera vez la vacuna contra la influenza (gripe) y para algunos otros niños en este grupo de edad. La vacuna contra la gripe debe recibirse anualmente.



Explicación de responsabilidad: Toda información sobre las dosis y vacunas necesarias fue obtenida del calendario infantil recomendado por el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Habla con tu médico o visita el sitio web del CDC <https://www.cdc.gov/spanish/> para obtener más información.

Actualizado abril 2023