

# Vacunas recomendadas en el 2023 para niños de

# 18 Meses

Escribe la fecha de vacunación en el cuadro junto a la vacuna una vez que tu hijo/a la haya recibido

<b>Vacuna HepB</b>	<b>Hepatitis B</b> (Esta dosis se puede administrar desde 1-2 meses)	(Dosis 3 de 3)	Fecha recibida
<b>Vacuna DTaP</b>	<b>Difteria, tosferina y tétanos</b> (Esta dosis se puede administrar desde 15-18 meses)	(Dosis 4 de 5)	Fecha recibida
<b>Vacuna IPV</b>	<b>Poliomielitis</b> (Esta dosis se puede administrar desde 6-18 meses)	(Dosis 3 de 4)	Fecha recibida
<b>Vacuna contra el COVID-19**</b>	<b>del coronavirus 2019</b>	(Dosis 1 de 1)	Fecha recibida
<b>Vacuna contra la influenza†</b>	<b>Influenza (gripe)</b>	(Dosis 1 de 1)	Fecha recibida
<b>Vacuna HepA‡</b>	<b>Hepatitis A</b> (Esta dosis se puede administrar desde 18-23 meses)	(Dosis 2 de 2)	Fecha recibida

## NOTAS A PIE DE PÁGINA

### COVID-19\*\*

La cantidad de dosis recomendadas Influenza† HepA‡ depende de la edad de su hijo y el tipo de vacuna contra el COVID-19 usada.

### Influenza†

Se recomiendan dos dosis con un intervalo de por lo menos 4 semanas para los niños de 6 meses a 8 años de edad que reciban por primera vez la vacuna contra la influenza (gripe) y para algunos otros niños en este grupo de edad. La vacuna contra la gripe debe recibirse anualmente.

### HepA‡

Se requieren 2 dosis de la vacuna HepA para que brinde protección duradera. Las 2 dosis deben administrarse entre los 12 y 23 meses de edad. Debe haber un intervalo de por lo menos 6 meses entre la administración de cada dosis. Los niños de 2 años o más que no hayan recibido 2 dosis de la vacuna HepA deben completar la serie.



**Explicación de responsabilidad:** Toda información sobre las dosis y vacunas necesarias fue obtenida del calendario infantil recomendado por el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Habla con tu médico o visita el sitio web del CDC <https://www.cdc.gov/spanish/> para obtener más información.

Actualizado abril 2023