

## Vacunas recomendadas para niños de

# 4 Meses

Escribe la fecha de vacunación en el cuadro junto a la vacuna una vez que tu hijo/a la haya recibido

<b>Vacuna RV*</b>	<b>Rotavirus</b>	(Dosis 2 de 3)	Fecha recibida
<b>Vacuna DTaP</b>	<b>Difteria, tosferina y tétanos</b>	(Dosis 2 de 5)	Fecha recibida
<b>Vacuna contra Hib*</b>	<b>Haemophilus influenzae tipo b</b>	(Dosis 2 de 4)	Fecha recibida
<b>Vacuna PCV15, PCV20</b>	<b>Enfermedad neumocócica</b>	(Dosis 2 de 4)	Fecha recibida
<b>Vacuna IPV</b>	<b>Poliomielitis</b>	(Dosis 2 de 4)	Fecha recibida
<b>VRS*</b> (RSV, por sus siglas en inglés)	<b>Virus respiratorio sincitial</b> (Esta dosis se puede administrar en cualquier lugar desde el nacimiento hasta los 19 meses. Habla con tu médico o proveedor de atención médica para obtener más información.)	(Dosis 1 de 1)	Fecha recibida

### NOTAS A PIE DE PÁGINA

#### **RV\*** **Hib\***

La administración de una tercera dosis a los 6 meses de edad depende de la marca de la vacuna contra Hib o el rotavirus usada para la dosis anterior.

#### **VRS\***

Es posible que tu hijo(a) necesite una vacuna contra el VRS. Habla con tu médico o proveedor de atención médica para más información.



**Explicación de responsabilidad:** Toda información sobre las dosis y vacunas necesarias fue obtenida del calendario infantil recomendado por el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Habla con tu médico o visita el sitio web del CDC <https://www.cdc.gov/spanish/> para obtener más información.

Actualizado febrero 2025