

Vacunas recomendadas para niños de

15 Meses

Escribe la fecha de vacunación en el cuadro junto a la vacuna una vez que tu hijo/a la haya recibido

Vacuna HepB	Hepatitis B (Esta dosis se puede administrar desde 6-18 meses. Habla con tu proveedor para obtener más información.)	(Dosis 3 de 3)	Fecha recibida
Vacuna DTaP	Difteria, tosferina y tétanos (Esta dosis se puede administrar desde 15-18 meses. Habla con tu médico para obtener más información.)	(Dosis 4 de 5)	Fecha recibida
Vacuna contra Hib*	Haemophilus influenzae tipo b (Esta dosis se puede administrar desde 12-15 meses. Habla con tu médico para obtener más información.)	(Dosis 4 de 4)	Fecha recibida
Vacuna PCV15, PCV20	Enfermedad neumocócica (Esta dosis se puede administrar desde 12-15 meses. Habla con tu médico para obtener más información.)	(Dosis 4 de 4)	Fecha recibida
Vacuna IPV	Poliomielitis (Esta dosis se puede administrar desde 6-18 meses. Habla con tu médico para obtener más información.)	(Dosis 3 de 4)	Fecha recibida
Vacuna contra el COVID-19**	Coronavirus 2019 (Se recomienda 1 o más dosis de la vacuna actualizada [fórmula 2024-2025]. Habla con tu médico para obtener más información.)	(Dosis 1 de 1)	Fecha recibida
Vacuna contra la influenza†	Influenza (gripe) (Estas vacunas se administran una vez al año, a partir de los 6 meses. Habla con tu médico para obtener más información.)	(Dosis 1 de 1)	Fecha recibida
Vacuna MMR	Sarampión, paperas y rubéola (Esta dosis se puede administrar desde 6-18 meses. Habla con tu médico para obtener más información.)	(Dosis 1 de 2)	Fecha recibida
Vacuna contra la varicela	Varicela (Esta dosis se puede administrar desde 12-15 meses. Habla con tu médico para obtener más información.)	(Dosis 1 de 2)	Fecha recibida
VRS* (RSV, por sus siglas en inglés)	Virus respiratorio sincitial (Esta dosis se puede administrar en cualquier lugar desde el nacimiento hasta los 19 meses. Habla con tu médico o proveedor de atención médica para obtener más información.)	(Dosis 1 de 1)	Fecha recibida
Vacuna HepA†	Hepatitis A (Esta dosis se puede administrar desde 12-18 meses. Habla con tu médico para obtener más información.)	(Dosis 1 de 2)	Fecha recibida

NOTAS A PIE DE PÁGINA

COVID-19**

La cantidad de dosis recomendadas depende de la edad de tu hijo y el tipo de vacuna contra el COVID-19 usada.

Influenza†

Se recomiendan dos dosis con un intervalo de por lo menos 4 semanas para los niños de 6 meses a 8 años de edad que reciban por primera vez la vacuna contra la influenza (gripe) y para algunos otros niños en este grupo de edad. La vacuna contra la gripe debe recibirse anualmente.

VRS*

Es posible que tu hijo(a) necesite una vacuna contra el VRS. Habla con tu médico o proveedor de atención médica para más información.

HepA†

Se requieren 2 dosis de la vacuna HepA para que brinde protección duradera. Las 2 dosis deben administrarse entre los 12 y 23 meses de edad. Debe haber un intervalo de por lo menos 6 meses entre la administración de cada dosis. Los niños de 2 años o más que no hayan recibido 2 dosis de la vacuna HepA deben completar la serie.



Explicación de responsabilidad: Toda información sobre las dosis y vacunas necesarias fue obtenida del calendario infantil recomendado por el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Habla con tu médico o visita el sitio web del CDC <https://www.cdc.gov/spanish/> para obtener más información.

Actualizado marzo 2025