

Vacunas recomendadas para niños de

4-6 Años

Escribe la fecha de vacunación en el cuadro junto a la vacuna una vez que tu hijo/a la haya recibido

Vacuna DTaP	Difteria, tosferina y tétanos	(Dosis 5 de 5)	Fecha recibida
Vacuna IPV	Poliomielitis	(Dosis 4 de 4)	Fecha recibida
Vacuna contra el COVID-19**	Coronavirus 2019 (Se recomienda 1 o más dosis de la vacuna actualizada [fórmula 2024-2025]. Habla con tu médico para obtener más información.)	(Dosis 1 de 1)	Fecha recibida
Vacuna contra la influenza†	Influenza (gripe) (Estas vacunas se administran una vez al año, a partir de los 6 meses. Habla con tu médico para obtener más información.)	(Dosis 1 de 1)	Fecha recibida
Vacuna MMR	Sarampión, paperas y rubéola	(Dosis 2 de 2)	Fecha recibida
Vacuna contra la varicela	Varicela	(Dosis 2 de 2)	Fecha recibida

NOTAS A PIEDE PÁGINA

COVID-19**

La cantidad de dosis recomendadas depende de la edad de tu hijo y el tipo de vacuna contra el COVID-19 usada.

Influenza†

Se recomiendan dos dosis con un intervalo de por lo menos 4 semanas para los niños de 6 meses a 8 años de edad que reciban por primera vez la vacuna contra la influenza (gripe) y para algunos otros niños en este grupo de edad. La vacuna contra la gripe debe recibirse anualmente.



Explicación de responsabilidad: Toda información sobre las dosis y vacunas necesarias fue obtenida del calendario infantil recomendado por el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Habla con tu médico o visita el sitio web del CDC <https://www.cdc.gov/spanish/> para obtener más información.

Actualizado marzo 2025